


# 植物活性剤シイリキッド 使用方法(10アール当り)

\*約100倍にうすめてお使いください。(水1ℓに10ml)

種類	土作り (土壌灌水)	定植～収穫まで (葉面散布、土壌灌水)	育苗の場合 (葉面散布、土壌灌水)	1作10a当り 製品使用量
葉根菜類 ～60日栽培	ほうれん草・小松菜・水菜 レタス・大根・中国野菜 等 約300ℓ(100倍液) *ハウス栽培(定植前の畝に灌水)	約150ℓ/1回(100倍液) ・生長期…2～3回 ・収穫期…3回(10日に1回)		11ℓ
葉根菜類 ～90日栽培	白菜・キャベツ・大根・人参 葱・ゴボウ・ブロッコリー 等 約600ℓ(100倍液) *ハウス栽培(定植前の畝に灌水)	約150ℓ/1回(100倍液) ・生長期…3～4回 ・収穫期…4回(10日に1回)	育苗箱・圃、ポット・鉢など 適当量 *苗床も濡れる程度 7～10日に1回	16ℓ
穀類	水稻・麦 等 約600ℓ(100倍液) *ハウス栽培(定植前の畝に灌水)	約150ℓ/1回(100倍液) ・田植え後1ヶ月頃…1回 ・分けつ期、出穂 …各1回		10ℓ
豆類	枝豆・インゲン・大豆・小豆 そら豆・黒豆・とうもろこし 等 約600ℓ(100倍液) *ハウス栽培(定植前の畝に灌水)	約150ℓ/1回(100倍液) ・生長期…2回 ・肥大期…3回		13ℓ
果菜類 長期栽培	トマト・茄子・キュウリ・ ピーマン・苺 等	約150ℓ/1回(100倍液) 10日に1回	・根元にもたっぷりと散布・灌水	
果菜類 一括収穫	メロン・スイカ・カボチャ 等 約600ℓ(100倍液) 前期収穫後から定植までに1回 *ハウス栽培(定植前の畝に灌水)	約150ℓ/1回(100倍液) ・開花前後 …各1回 ・収穫1ヶ月前から…3～4回		15ℓ
花卉類 長期栽培	バラ・菊・カーネーション トルコギキョウ	約100ℓ/1回(100倍液) 10日に1回	・根元にもたっぷりと散布・灌水	
きのこ類	椎茸・しめじ・舞茸・えのき茸 なめ茸・マッシュルーム 等 約200倍にうすめてお使いください。7～10日に1回 ホダ木や菌床の浸漬。			
果樹類	桃・ブドウ・イチジク・ナシ・柿 りんご・みかん・梅 等	土壌灌水 約600ℓ/1回 葉面散布 約150ℓ/1回	・3ヶ月に1回(根・幹の周り) 動力噴霧器で。開花前後は細霧散布	
茶		土壌灌水 約600ℓ/1回 葉面散布 約450ℓ/1回(10～1月は1回/月、2～9月は2回/月)		
水耕栽培		初期:水中が1万倍になるように散布 収穫まで約150ℓ(1週間から10日間隔で葉面散布)		
鉢物・盆栽	観葉植物・高山植物・ さつき・松・柏 等	葉面散布 適当量散布 根元にも水やり ・年間を通して、2～3回/月		
鉢花類	シクラメン・草花 等	育苗から出荷まで 約100ℓ/1回 ・10日に1回 *株元にもたっぷりと散布		



## 注意

- ①薬剤を使用する場合は、先に100倍液を作り、後から薬剤を使用してください
- ②ボルドー液、石灰硫黄合剤との混用散布は避けてください